

Fourrages : La météo joue les trouble-fêtes

Les conditions météorologiques ne se sont toujours pas améliorées pour pouvoir réaliser des foins dans de bonnes conditions. A cette date, nous observons dans certains secteurs du département des cumuls de pluviométrie, qui depuis le début de l'année, correspondent pratiquement à ceux d'une année entière. Les sommes de températures enregistrées à ce jour, montrent que l'ensemble des prairies a atteint la pleine floraison, ce qui correspond malheureusement à des foins tardifs et grossiers ; les quantités de matières sont présentes, et il est temps de pouvoir les récolter avant que le second cycle de pousse des graminées ne reprenne.

Face à cette situation inédite, il serait judicieux de pouvoir récolter une partie des prairies en enrubbage afin d'améliorer un peu la qualité des fourrages et notamment l'appétence.

Les récoltes en foin devront être surveillées quelques temps afin d'éviter l'échauffement qui pourrait nuire aux valeurs alimentaires du fourrage. En effet un foin qui chauffe se traduit par une perte de la valeur énergétique et les protéines deviennent de moins en moins digestibles ce qui nécessitera ultérieurement des compléments alimentaires pour ajuster les apports aux besoins des animaux.



| Commune | Température | Pluviométrie depuis Le 01 janvier 2018 | Pluviométrie depuis le 01/6/2018 |
|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| Castelnaudary (170 m) | 1499° jour | 492 mm | 22 mm |
| Alaigne (320 m) | 1465° jour | 512 mm | 50 mm |
| Fanjeaux (360 m) | 1501° jour | 411 mm | 47 mm |
| Granes (312 m) | 1424° jour | 511 mm | 42 mm |
| Mouthoumet (538 m) | 1286° jour | 585 mm | 28 mm |
| Labécède Lauragais (306 m) | 1365° jour | 758 mm | 131 mm |
| Saint Benoit (406 m) | 1264° jour | 634 mm | 23 mm |
| Belcaire (1002 m) | 960° jour | 821 mm | 50 mm |
| Puivert (510 m) | 1335° jour | 829 mm | 29 mm |
| Les Martyrs (780 m) | 1023° jour | 996 mm | 39 mm |
| Belpech (240 m) | 1459° jour | 681 mm | 65 mm |

Somme des
10 juin 2018
(données Météo France)



Ces sommes de températures sont à apprécier en fonction de la localisation de vos parcelles et des différents postes météo disponibles.

L'important est de vous reporter à la station la plus proche de celles de vos parcelles.

| | Départ en végétation | Epi à 10 cm du sol | Début épiaison | Pleine épiaison | Pleine floraison |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | Mise à l'herbe | Fin déprimage | Ensilage enrubbage | Foin de qualité | Foin tardif grossier |
| Prairie temporaire précoce | 250° jour | 500° jour | 750° jour | 850° jour | 1000° jour |
| Prairie permanente fertile et précoce | 300° jour | 600° jour | 850° jour | 1100° jour | 1200° jour |
| Prairie permanente de fertilité moy. | 450° jour | 900° jour | 1000° jour | 1250° jour | 1600° jour |